

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Lenicet[®]-Salbe

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

10 g Salbe enthalten: 0,085 g Aluminium-diacetat-hydroxid, 0,115 g Algelatrat

Sonstige Bestandteile:

Wollwachs, hochdisperses Siliciumdioxid, gelbe Vaseline, Hartparaffin, dünnflüssiges Paraffin, Eukalyptusöl, Gereinigtes Terpentinöl, Spiköl, Dimeticon.

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 32 g Salbe

Originalpackung mit 62 g Salbe

Traditionelles Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer:

athenstaedt Nachf. GmbH + Co. KG, Böcklinstr. 1, 80638 München,
Hersteller: Schöning Pharmazeutische Präparate GmbH & Co. KG Berlin
Porschestraße 22/24, 12107 Berlin

Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zum Schutz der Haut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferungen und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen wie z. B. Hautveränderungen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Lenicet[®]-Salbe nicht anwenden?

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile.

Wann dürfen Sie Lenicet[®]-Salbe erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Für Lenicet[®]-Salbe sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Tragen Sie Lenicet[®]-Salbe nicht auf offene oder blutende Wunden auf. Der Kontakt mit Schleimhäuten ist zu vermeiden. Aufgrund des Gehalts an Wollwachs können bei Anwendung dieses Arzneimittels Hautirritationen auftreten. Möglich sind auch Spätreaktionen wie Kontaktdermatitis.



Was müssen Sie bei der Anwendung von Lenicet[®]-Salbe in der Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern beachten?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Ebenso fehlen Untersuchungen zur Anwendung des Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Lenicet[®]-Salbe und was müssen Sie beachten, wenn Sie zusätzlich andere Arzneimittel anwenden?

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Lenicet[®]-Salbe nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Lenicet[®]-Salbe sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie Lenicet[®]-Salbe anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, tragen Sie Lenicet[®]-Salbe 2mal täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen auf. Bitte beachten Sie den Hinweis unter Anwendungsgebiete.

Wie und wann sollten Sie Lenicet[®]-Salbe anwenden?

Verreiben Sie Lenicet[®]-Salbe sanft mit den Fingerspitzen auf die Haut.

Wie lange sollten Sie Lenicet[®]-Salbe anwenden?

Die Dauer der Anwendung dieses Arzneimittels ist nicht prinzipiell begrenzt, bitte beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsgebiete.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Lenicet[®]-Salbe auftreten?

Äußerst selten kann es zu allergischen Reaktionen mit Hautausschlägen (allergisches Exanthem) kommen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sollten Sie die oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, soll Lenicet[®]-Salbe nicht nochmal angewendet werden. Benachrichtigen Sie Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Lenicet[®]-Salbe nicht mehr angewendet werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Haltbarkeit nach Anbruch: 4 Wochen

Nicht über 20° C aufbewahren.

Stand der Information: September 2003

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

