

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

FORTAKEHL® D5 Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel · Wirkstoff: **Penicillium roquefortii D5**



Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

250 mg **Penicillium roquefortii D5** trit. (HAB, Vorschrift 6).

Sonstige Bestandteile: Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.

Hinweis für Diabetiker: 1 Tablette enthält weniger als 0,1 BE.

Darreichungsform und Inhalt: 20 Tabletten oder 200 Tabletten zum Einnehmen.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-KEHLBECK

GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung

Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

*Wann dürfen Sie **FORTAKEHL® D5** nicht anwenden?*

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Penicillium roquefortii).

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Hinweis: Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden Galactose-Unverträglichkeit (Galactose – Intoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflußt werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **FORTAKEHL® D5** anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet: 1-3 mal täglich 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.

*Wie lange sollten Sie **FORTAKEHL® D5** anwenden?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum ist auf dem Blisterstreifen und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Gebrauchsinformation: 14. 05. 2002.

Hinweis: Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Zur weiteren Anwendung stehen **FORTAKEHL®** Injektionen, Tropfen, Kapseln und Zäpfchen zur Verfügung.