

Gebrauchsinformation

Husten-Löser Sirup

Hersteller:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Sulzbacher Str. 40 - 50

D-65824 Schwalbach am Taunus



Husten-Löser Sirup

Wirkstoff: 200 mg Guaifenesin/15 ml

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss WICK Husten-Löser Sirup jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 - 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist WICK Husten-Löser Sirup und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von WICK Husten-Löser Sirup beachten?
3. Wie ist WICK Husten-Löser Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist WICK Husten-Löser Sirup aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST WICK HUSTEN-LÖSER SIRUP UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

WICK Husten-Löser Sirup ist ein Arzneimittel zum leichteren Abhusten von Schleim.

Anwendungsgebiete:

Zur Schleimlösung im Bronchialbereich und zur Erleichterung des Abhustens bei

- Erkältungen und grippalen Infekten
- Bronchitis.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON WICK HUSTEN-LÖSER SIRUP BEACHTEN?

WICK Husten-Löser Sirup darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Guaifenesin, Ponceau 4R (E 124) oder einen der sonstigen Bestandteile von WICK Husten-Löser Sirup sind
- bei Magen- und Darmerkrankungen
- von Kindern unter 14 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von WICK Husten-Löser Sirup ist erforderlich,

- bei eingeschränkter Funktion der Nieren
- bei Myasthenia gravis (einer Erkrankung des Körperabwehrsystems, die zu einer vorzeitigen Ermüdung der Muskulatur bei Belastung führt).

Bei Einnahme von WICK Husten-Löser Sirup mit anderen Arzneimitteln

in Pfeilrichtung drehen.

Dauer der Anwendung

Die Selbstbehandlung mit WICK Husten-Löser sollte auf 3-5 Tage begrenzt sein. Sofern dann noch keine wesentliche Besserung des Abhustens von Schleim eingetreten ist oder bei anhaltendem Husten, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da eine ernsthaftere Erkrankung vorliegen könnte. WICK Husten-Löser darf nicht länger als zwei Wochen hintereinander eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von WICK Husten-Löser Sirup zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge WICK Husten-Löser Sirup eingenommen haben, als Sie sollten Bei Einnahme zu hoher Arzneimengen kommt es in der Regel zu keinen Vergiftungserscheinungen. Bei stark überhöhten Einnahmemengen ist mit Übelkeit und Erbrechen sowie einer Muskelererschaffung zu rechnen. In diesem Fall sollte der nächst erreichbare Arzt zu Hilfe gezogen werden.

Wenn Sie die Einnahme von WICK Husten-Löser Sirup vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein.

Wenn Sie die Einnahme von WICK Husten-Löser Sirup abbrechen

Falls Sie die Behandlung infolge von Nebenwirkungen abbrechen, fragen Sie bitte Ihren Arzt, welche Gegenmaßnahmen es gibt. Falls Sie das Arzneimittel absetzen, weil es bei Ihnen nicht wie erwünscht wirkt, fragen Sie bitte Ihren Arzt, ob andere Arzneimittel in Frage kommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann WICK Husten-Löser Sirup Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelte von 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandelte von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Sehr selten wurden z. T. schwere Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen einschließlich des anaphylaktischen Schocks), tiefe Bewusstlosigkeit (Koma), Verwirrung (Konfusion), verlangsamte Herzschlagfolge (Bradykardie), Krampf der Bronchialmuskulatur (Bronchospasmus), erschwerte Atmung (Dyspnoe), Verminderung bestimmter weißer Blutkörperchen (Granulozytopenie) gesehen.

Vor Eintreten solcher Reaktionen können Wärmegefühl, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Magenbeschwerden, Sodbrennen, Schmerzen, Hautausschlag und Juckreiz auftreten. Ponceau 4R (E 124) kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

WICK Husten-Löser kann die Wirkung verstärken von

- sedierenden Arzneimitteln (sog. Beruhigungsmitteln)
- muskelrelaxierenden Arzneimitteln (Mitteln zur Verminderung eines gesteigerten Spannungszustandes der Muskulatur, die z.B. bei der Betäubung [Narkose] während einer Operation angewendet werden).

Bei Einnahme von WICK Husten-Löser Sirup zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken Keine Einschränkungen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

WICK Husten-Löser darf in der Schwangerschaft nicht angewendet werden, da es beim Menschen Hinweise auf Fehlbildungen gibt (Nabelbrüche) und für das zweite und dritte Schwangerschaftsdrittel keine genügenden Erfahrungen vorliegen. WICK Husten-Löser darf in der Stillzeit nicht angewendet werden, da nicht bekannt ist, ob WICK Husten-Löser in die Muttermilch übergeht.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von WICK Husten-Löser Sirup

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie WICK Husten-Löser erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

15 ml enthalten 5,55 g Sucrose (Zucker) entsprechend ca. 0,46 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält 5 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme 0,63 g Alkohol (pro 15 ml) zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

3. WIE IST WICK HUSTEN-LÖSER SIRUP EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie WICK Husten-Löser Sirup immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren nehmen alle 4 Stunden bis zum Schlafengehen 15 ml (gemäß Messbecher), entsprechend 200 mg Guaifenesin.

Die Lösung soll nicht mehr als 6x täglich eingenommen werden.

Art der Anwendung

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Den kindergesicherten Verschluss zum Öffnen niederdrücken und gleichzeitig

Sollten Sie Anzeichen einer der oben geschilderten, schwerwiegenden Nebenwirkungen bei sich beobachten, so rufen Sie bitte den nächst erreichbaren Arzt zu Hilfe.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST WICK HUSTEN-LÖSER SIRUP AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was WICK Husten-Löser Sirup enthält

Der Wirkstoff in 15 ml Sirup ist Guaifenesin 200 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gereinigtes Wasser, Sucrose, Propylenglycol, Ethanol 96%, Natriumcitrat 2 H₂O, Citronensäure, Carmellose-Natrium, Polyethylenoxid, Macrogolstearat, Natriumbenzoat, Saccharin-Natrium, Aromastoffe, Ponceau 4R (E 124)

Wie WICK Husten-Löser Sirup aussieht und Inhalt der Packung

Rote, viskose Flüssigkeit

120 ml Sirup zum Einnehmen

Pharmazeutischer Unternehmer

WICK Pharma

Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

D-65823 Schwalbach

Tel.: 0800/9425847

Hersteller

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Sulzbacher Str. 40 - 50

D-65824 Schwalbach

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2008.