Gebrauchsinformation

LEBERTRAN

Öl zum Einnehmen

Stoff- oder Indikationsgruppe:
Lebertranpräparat.

Anwendungsgebiete:
Prophylaxe der Rachitis. Vitaminmangel während der Schwangerschaft und in der Stillperiode.

Gegenanzeigen:
Lebertran ist nicht anzuwenden bei erhöhtem Calciumplasma spiegel, erhöhter Calciumausscheidung über die Niere und wenn andere Vitamin-D-haltige Arzneimittel verabreicht werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, nehmen bei Bedarf Säuglinge 1 Teelöffel (5 ml), Kleinkinder 1 bis 2 Teelöffel (5 bis 10 ml), Jugendliche und Erwachsene bis zu 1 Esslöffel (20 ml) voll Lebertran täglich ein.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Nebenwirkungen:
Bei Einhalten der angegebenen Dosierung ist nicht mit dem Auftreten von Nebenwirkungen zu rechnen.

Hinweis:
Bei Einnahme größerer Mengen Lebertran (mehr als 5 Esslöffel täglich) können Anzeichen einer Vitamin-A-Überdosierung auftreten wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schlafstörungen,

Lebertran_7840_03396139_Gebrauchsinformation_250ml_20260706.indd 1 13.10.2026 13:40:21

Appetitlosigkeit, Gelenkschmerzen und Fissuren der Mundschleimhaut. Während der ersten drei Monate einer Schwangerschaft soll die tägliche Einnahme von mehr als einem Esslöffel voll Lebertran vermieden werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise:
Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden. Gut verschlossen und nicht über 25 °C aufbewahren. Angebrochene Flaschen sollen innerhalb von 4 Wochen verbraucht werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren

Zusammensetzung:
100 g Caelo Lebertran enthalten arzneilich wirksame Bestandteile:
Lebertran 100 g mit mindestens 850 I.E. Vitamin A/g und mindestens 85 I.E. Vitamin D/g.

Darreichungsform und Inhalt:
250 ml Öl

Pharmazeutisches Unternehmen:
Caesar & Loretz GmbH, Herderstraße 31, 40721 Hilden
www.caelo.de

Stand der Information: Oktober 2026

56203V2 V7840B 1026